

BOVACLOX DC EXTRA

Kuru Dönem Meme İçi Süspansiyon
Veteriner Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

Bovaclox DC Extra meme içi süspansiyon açık krem renğinde bu süspansiyon olup 5.4 gramlık meme içi enjektörü içinde 600 mg kloksasilin'e eşdeğer kloksasilin benzathine ve 300 mg ampisilin'e eşdeğer ampisilin trihidrat içerir.

ENDİKASYON

Bovaclox DC Extra mem içi süspansiyonu ,kuru dönemdeki ineklerde gram (')ve gram(-) bakterilerden ileri gelen meme içi enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka türlü önerilmedi ise;

Kuru dönem tedavisi : Kuruya ayrılan ineklere en son sağından hemen sonra meme ucu iyice temizlenip, dezenfekte edilir. Meme içi enjektörü,ucu kontamine olmamasına dikkat edilerek meme ucuna yerleştirilir. Hafif ve sürekli bir basınçla süspansiyon her bir meme içine verilir.

Yaz mastitisi tedavisi : Yaz mastitisinin riskli olduğu yavrulama öncesi, meme ucu iyice temizlenip, dezenfekte edilir. Meme içi enjektörü ,ucu kontamine olmamasına dikkat edilerek meme ucuna yerleştirilir. Hafif ve sürekli bir basınçla süspansiyon her bir meme içine verilir.

GENEL UYARI

1. Kullanmadan önce ve beklenmedik bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
2. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
3. Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
4. Ambalajı hasarlı olan ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç kalınlı arınma süresi : Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra 35 gün geçmeden sığırlar kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 20 gün (40 sağım) boyunca elde edilen süt insan tüketimine sunulmamalıdır. Doğumdan sonra 5 gün boyunca elde edilen süt insan tüketimine sunulmamalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Direkt ışıktan koruyarak 25 C ' nın altında saklanmalıdır. Üretim tarihinden itibaren 24 aydır.